M. michault fils maitre en chirurgie a notre dame des vertus dit aubervilliers les paris a communiqué a l'academie une observation sur un abcès au scrotum compliqué d'ulcération au testicule gauche.

un homme, dit-il, agé d'environ 38. ans eut en 1773. sans qu'on pût en assigner aucune cause une tumeur au testicule gauche, laqu'elle se dissipa en grande partie par l'usage des cataplasmes émolliens. il ne lui resta de cette incommodité qu'un engorgement a l'epididyme et un Léger gonflement au testicule. le 30. janvier 1777. le meme testicule devint tendu, dur, inégal, enflammé, et au moins du double plus gros que le droit. M. michault fit une ample saignée et employa des topiques adoucissans. malgré ces secours, la tumeur augmenta, les douleurs devinrent plus vives, et le malade éprouva dans la partie gauche de l'abdomen des tiraillemens qui sont l'effet ordinaire de cette espéce de maladie.

La perséverance de ces facheux symptomes malgré l'usage des remedes emolliens et resolutifs, jetterent le malade dans un état d'epuisement qui effraya M. michault: comme la tumeur étoit devenue monstrueuse et qu'elle ne faisoit aucun progrés vers la suppuration, ce chirurgien crut que le seul parti qui lui restoit a prendre étoit d'inciser la tumeur de mettre le testicule a découvert et meme d'en faire l'amputation s'il se trouvoit en mauvais état. cependant l'importance de cette operation ainsi que l'irrésolution du malade firent heureusement differer ce procédé. les cataplasmes émolliens furent donc continués. le 18. feuvrier, M. michault commença a sentir une fluctuation profonde dans la tumeur. le 23. il trouva vers le centre une petite ouverture a peine suffisante pour recevoir un stilet de la qu'elle sortoit un peu de pus sanguinolent. il aggrandit cette ouverture en incisant superieurement et inferieurement. cette opération donna issue a plus d'une chopine de pus et a plusieurs caillots de sang, il survint, dit, M. michault, une hemorragie, qui cependant fut

MARET

fut arrêtée par un pansement très simple. après cette première opération il se manifesta encore à différens intervalles, dans le cours du traitement, deux abscès, dont l'un se vuida à l'aide d'une légère compression, par l'ouverture déja faite, et l'autre fut ouvert avec le bistouri. des injections détersives et des cataplasmes d'eau végéto minerale furent mis en usage, au bout d'un mois et quelques jours de la première opération, le malade fut parfaitement guéri.

Le volume excessif de la tumeur, les simptomes qui l'ont accompagnée les différens abscès par les quels elle s'est terminée ont fait croire à M. michault que le testicule avoit été affecté d'ulcération, cependant il dit avoir reconnu après l'évacuation du pus, suite de sa première opération, que le testicule étoit sain. les abscès consécutifs paroissent donc s'être formés plutôt dans les parties adjacentes que dans la substance propre du testicule.

quant au traitement nous croyons devoir lui reprocher 1o. l'omission des saignées et des demi-bains qui dans les premiers tems de la maladie en auroient probablement prévenu la longue terminaison. 2o. d'avoir eu l'intension d'inciser et même d'amputer le testicule. peu jaloux d'une vaine gloire. mais animé du seul désir d'être utile à l'humanité, M. michault, termine son observation en témoignant à l'academie la satisfaction, dont il jouiroit si le fait qu'il lui communique pouvoit trouver place dans ses mémoires. si les connoissances de M. michault sur ce point de chirurgie avoient ~~été~~ plus étendues, ce fait lui auroit paru, et moins rare et moins interressant./.   marti